

Kæmpe-Balsamin en invasiv plante



Blomsten er smuk, men planten breder sig hurtigt og udkonkurrerer den naturlige flora langs vandløbene

Indsæt evt. logo her

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------|---|--------|-----------|-----------------------------|
| | APRIL | MAJ | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER |
| Få planter 1-50 planter eller > 20 m mellem planterne | | | | | | | Visner ned med første frost |
| Middel Planterantal 50-500 planter eller 2-20 m mellem planter | Hugning hver 4. uge | | | Materiale fjernes efter evt. bekæmpelse | | | |
| Mange planter > 500 planter, < 2 m afstand mellem planter | Slå- eller klipping hver 4. uge (le, plæneklipper, græsstrimmer) | | | | | | |
| Mange planter OBS! Ikke nær vandløb | Evt. sprøjtning indtil planterne er 15-20 cm høje | | | | | | |

Fortæl kommunen, hvis du finder planten
I Xx Kommune er planten blandt andet fundet ved _____ og _____.

Vi vil meget gerne vide besked om andre fund i kommunen.

Du kan selv taste dit fund ind via nettet på www._____.dk Her registrerer vi også selv løbende planter, vi finder.

Du kan også kontakte Xx Kommune (se forsiden) eller rette direkte henvendelse til _____ på tlf. 1234 5678 eller _____ på tlf. 9876 5432

Er du interesseret i at medvirke til at bekæmpe invasive plantearter, hører vi gerne fra dig.

Du kan læse mere på www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter og www.fugleognatur.dk

Fortæl os, hvis du finder Kæmpe-Balsamin



Kæmpe-Balsamin stammer fra Himalaya, hvor den vokser i 2-4.000 meters højde, bl.a. i Kashmir.

Planten kan blive 2-3 m høj. Den har røde eller rødlig stængler med 'knæ' ligesom bambus. Bladene har synlige kirtler ligesom Flittig-Lise, og den blomstrer fra juli til september. Blomsterne er 2-4 cm store og pinkfarvede, rosa eller hvide.

De kan minde lidt om orkidéer.

Blomsterne indeholder nektar.

Desværre foretrækker bier og andre insekter denne blomst, så vores hjemlige arter ikke bestøves så godt, når der er Kæmpe-Balsamin i området.

Voksested

Kæmpe-Balsamin tåler ikke tørke men gror gerne i fugtige, næringsrige områder. Det er langs vandløb, den giver største problemer.

Planten spirer ca. 1. april og vokser hurtigt. Den danner tætte bestande, der hurtigt kommer sig, når de er slået ned. Kæmpe-Balsamin ser ud til at reagere positivt på klimaforandringerne.

Planten visner ned i efteråret. Langs vandløb, risikerer jorden derfor at skylle ned i vandløbet, fordi der ikke er anden plantevækst til at holde på jorden.

Formering

Når frøcapslerne er modne, springer de op ved den mindste berøring, og frøene slynges op til 7 meter væk. Hver plante kan få 2.500 spiredygtige frø. De kan flyde i vand og på denne måde sprede sig via vandløbet.



Undgå at sprede planten - kast ikke haveaffald i naturen

Bekæmpelse

Kæmpe-Balsamin bekæmpes bedst inden 1. juli før den blomstrer. Bekæmper man senere, kan blomsten bestøve sig selv og udvikle spiredygtige frø, selvom stænglen er skåret over.

De første 1-2 måneder efter fremspiring er den let at rykke op med rod. Herefter er det bedst at slå den med le eller buskrydder.

Metoder

I det tidlige forår kan de små frøplanter nemt luges. Rødderne slipper let, og har de ikke længere kontakt med vand eller jord, vil de visne.

Hvis roden ikke er beskadiget tilstrækkeligt, kan planten skyde igen. Derfor anbefales det at bekæmpe ca. hver 4. uge frem til blomstring.

Ved større forekomst kan det være nødvendigt at slå med le eller buskrydder. Der slås så tæt på jorden som muligt, så de sidst spirede planter også bekæmpes og genvækst begrænses.

Gror Kæmpe-Balsamin langs et vandløb, vil der med stor sandsynlighed, også findes planter længere nede ad vandløbet, som bør bekæmpes.

Ved bekæmpelse efter 1. juli skal plantematerialet samles op i affaldssække og sendes til forbrænding for at undgå udvikling af spiredygtige frø.

Da frøene er spiredygtige i op til 2½ år, bør bekæmpelsen følges op i 3 vækstsæsoner.